RP-HPLC 法测定肛安栓中盐酸小檗碱的含量

高 辉, 徐丽华, 崔丽华 (山东省药品检验所, 济南 250101)

摘要: 目的 采用 RP-HPLC 法测定 肛安栓中盐酸小檗碱的含量。方法 色谱柱为 Diamonsil C18; 流动相为乙腈-0.05 mol·L⁻¹ 磷酸二氢钠溶液 (用磷酸调节 pH 值至 3) (30:70); 检测波长为 270nm。结果 盐酸小檗碱的进样量在 0.16765~0.50294 μg 之间与峰面积呈良好的线性关系, $r=1.0000$, 平均加样回收率为 96.62%, RSD=0.80% ($n=6$)。结论 本方法简便、准确, 可用于 肛安栓中盐酸小檗碱的含量测定。

关键词: 肛安栓; 盐酸小檗碱; HPLC; 含量测定

中图分类号: R284; R927.2 文献标识码: A 文章编号: 1002-7777 (2011) 09-0927-03

Determination of Berberine Hydrochloride in Gangan Suppositories by RP-HPLC

Gao Hui, Xu Lihua and Cui Lihua (Shandong Institute for Drug Control, Jinan 250101)

ABSTRACT: **Objective** To develop a RP-HPLC method for the assay of berberine hydrochloride in Gangan Suppositories. **Methods** Diamonsil C18 was used with acetonitrile-0.05M sodium hydrogen phosphate (adjusting the pH value to 3 with phosphoric acid) (30:70) as mobile phase. The detection wavelength was set at 270nm. **Results** The linear range was 0.16765~0.50294 μg ($r=1.0000$). The average recovery was 96.62% and RSD was 0.80% ($n=6$). **Conclusion** The method is simple and accurate. It can be used for determination of berberine hydrochloride in Gangan Suppositories.

KEY WORDS: Gangan Suppositories; berberine hydrochloride; HPLC; determination

肛安栓是由地榆炭、五倍子、盐酸小檗碱、人工麝香、冰片等 5 味中药组成的复方制剂, 具有凉血止血, 清热解毒, 燥湿敛疮, 消肿止痛功效, 临床上用于湿热下注所致的内痔、混合痔以及炎性外痔。本品是烟台荣昌制药有限公司独家生产的品种, 现行标准为国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS3-129 (Z-129)-2001 (Z)。已有盐酸小檗碱含量测定, 其测定方法为硅藻土拌样, 硫酸溶液回流提取后, 采用紫外-可见分光光度法。该法操作繁琐, 受外界干扰因素多, 影响结果的准确性。本法以盐酸小檗碱为指标, 采用高效液相色谱法测定含量, 增加含量测定方法的专属性和准确性, 以控制其制剂质量。

1 仪器与试剂

Agilent 1200 高效液相色谱仪; Sartorius CP225D 电子天平; 盐酸小檗碱对照品 (中国药品生物制品检定所, 供含量测定用, 批号为 110713-

200911)。样品和阴性对照 (烟台荣昌制药有限公司, 样品批号为 090501、090502、100101)。甲醇、乙腈为色谱纯, 水为超纯水, 盐酸和磷酸等其他试剂均为分析纯。

2 方法和结果^[1-4]

2.1 色谱条件

色谱柱: Diamonsil C18 (250mm × 4.6mm, 5 μm); 流动相: 乙腈-0.05 mol/L 磷酸二氢钠溶液 (用磷酸调节 pH 值至 3) (30:70), 流速: 1 mL·min⁻¹; 进样量: 10 μL, 柱温: 35 °C; 紫外检测器, 检测波长: 270nm。理论板数以盐酸小檗碱峰计算应不低于 3000, 分离度应大于 2.0。

2.2 溶液的制备

对照品溶液的制备: 精密称取盐酸小檗碱对照品 10.73mg (含量 86.8%), 置 100mL 量瓶中, 加稀乙醇溶解并稀释至刻度, 摇匀, 精密量取 3mL, 置 10mL 量瓶中, 加流动相稀释至刻度, 摇

匀, 即得 (浓度 $0.027941 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$)。

供试品溶液的制备: 取重量差异项下的本品, 切碎, 混匀, 取约 0.2 g , 精密称定, 置烧瓶中, 精密加入盐酸-甲醇 (1: 100) 的混合溶液 50 mL , 称定重量, 加热回流并保持沸腾 20 分钟, 放冷, 再称定重量, 用盐酸-甲醇 (1: 100) 的混合溶液补足减失的重量, 摇匀, 冷冻 30 分钟, 取出, 滤过, 放至室温, 精密量取续滤液 2 mL , 置 10 mL 量瓶中, 用流动相稀释至刻度, 摇匀, 滤过, 取续滤液, 即得。

2.3 线性关系的考察

分别精密吸取盐酸小檗碱对照品溶液 (浓度为 $0.027941 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$) 各 $6, 9, 12, 15, 18 \mu\text{L}$, 注入液相色谱仪, 分别测定峰面积积分值。以对照品进样量为横坐标, 以盐酸小檗碱峰面积积分值为纵坐标, 进行线性回归, 得回归方程:

$$Y = 4.3394 \times 10^3 X - 1.1838 \times 10^4 \quad r = 1.0000$$

结果表明, 盐酸小檗碱进样量在 $0.16765 \sim 0.50294 \mu\text{g}$ 之间与峰面积呈良好的线性关系。

2.4 精密度试验

精密吸取 $0.027941 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 盐酸小檗碱对照品溶液 $10 \mu\text{L}$, 注入液相色谱仪, 连续进样 6 次, 测峰面积, RSD 为 0.10% , 表明仪器精密度良好。

2.5 稳定性试验

精密吸取同一供试品溶液 $10 \mu\text{L}$, 注入液相色谱仪, 每隔 2h 进样一次, 记录盐酸小檗碱的峰面积, 共考察 10h, RSD 为 0.13% , 表明被测溶液在 10h 内基本稳定。

2.6 重复性试验

取同一批号的肛安栓约 0.2 g , 共 6 份, 精密称定, 按供试品溶液的制备方法制备, 按上述色谱条件测定, 测得平均含量 $34.22 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, RSD 为 0.64% , 表明本品含量测定方法的重复性良好。

2.7 加样回收率试验

精密称取已知含量的同一批号 (批号 090501, 含量 $34.22 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$) 样品 0.1 g , 分别精密加入盐酸小檗碱对照品溶液 (浓度为 $0.027941 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$) 各 10 mL , 按供试品溶液的制备方法制备及上述色谱条件进行测定, 计算回收率。平均回收率为 96.62% , RSD 为 0.80% 。结果表明测定方法的回收率良好。

2.8 专属性试验

按处方中药味的比例制成缺盐酸小檗碱的阴性对照样品, 同供试品溶液的制备方法制成阴性对照

溶液。

分别精密吸取对照品溶液、供试品溶液及阴性对照溶液各 $10 \mu\text{L}$, 注入液相色谱仪测定。结果, 盐酸小檗碱峰与杂质峰能达到基线分离, 阴性对照无干扰。肛安栓样品 HPLC 色谱图见图 1。

图 1 肛安栓样品 HPLC 色谱图

2.9 样品含量测定

按供试品溶液的制备方法以及上述色谱条件对 3 批样品进行测定, 结果见表 1。

表 1 样品测定结果 $\text{mg} \cdot \text{粒}^{-1}$

样品批号	090501	090502	100101
平均含量	34.6	33.7	33.1

3 讨论

实验过程中考察了超声和回流两种提取方法, 不同取样量和提取时间。结果表明, 取样 0.2 g , 盐酸-甲醇 (1: 100) 的混合溶液 50 mL 作为提取溶剂, 加热回流并分别保持沸腾 20 分钟提取效果最好, 故选之。

根据文献报道^[3], 选用乙腈- $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 磷酸二氢钠溶液 (用磷酸调节 pH 值至 3) (30: 70) 为流动相, 色谱柱为 Diamonsil C18 ($250 \text{ mm} \times 4.6 \text{ mm}, 5 \mu\text{m}$) 对本品进行试验, 所得色谱图的分离度好, 保留时间较合适。以被测组分盐酸小檗碱峰计算理论塔板数为 9196, 考虑到仪器、色谱柱、流动相的配制和温度等系统因素的影响, 规定理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于 3000。此外使用色谱柱 SHIMADZU VP-ODS ($250 \text{ mm} \times 4.6 \text{ mm}, 5 \mu\text{m}$) 按上述确定的方法和条件进行测定, 所得的对称因子、理论板数等均能符合 2010 年版药典对高效液相色谱分析的有关要求, 说明选择该流动相测定盐酸小檗碱, 对色谱柱选择性不强, 适用范围广。

HPLC 法测定本制剂中盐酸小檗碱的含量, 具有简便、快速、重现性好的特点, 为肛安栓制定质量标准提供了实验依据。

参考文献:

- [1] 隋艳杰, 赵艳, 付艳敏, 等. HPLC 法测定胃益胶囊中盐酸小檗碱的含量 [J]. 吉林中医药, 2009, 29 (10): 895-896

大图。以此谱段为基础，决定系数 R^2 、内部交叉验证均方差 (RMSECV)、外部验证均方差 (RMSEP) 为评价指标，用矢量归一化 (Vector normalization)、多元散射校正 (MSC) 等 5 种常用预处理方法对模型的影响进行考察，见表 2。

表 2 不同光谱预处理方法
所得模型的 R^2 RMSECV 及 RMSEP 比较

光谱预处理方法	R^2	RMSECV	RMSEP
一阶导数+ 矢量归一化	89.66	2.79	3.94
一阶导数+ 多元散射校正	89.34	2.80	4.00
一阶导数	92.54	2.70	3.34
矢量归一化	95.17	1.66	2.69
多元散射校正	95.19	1.67	2.68

由表 2 可知，以 R^2 越接近 100、RMSECV 和 RMSEP 越小越优来看，用多元散射校正 (MSC) 预处理方法所得模型其 R^2 最大，并且外部验证均方差最小。因此，最终确定以多元散射校正 (MSC) 作为预处理方法。

4.2 建模谱段的选择

在确定光谱预处理方法后，结合软件自动优化结果，以决定系数、内部交叉验证均方差 (RMSECV)、外部验证均方差 (RMSEP) 为评价指标，对建模谱段进行优化，最终确定建模谱段为 $6102.1 \sim 5774.2 \text{ cm}^{-1}$ 。

4.3 注意事项

在实际检测中应注意：一是测定时近红外检测探头应垂直向下；二是每批样品测定后应将粘有样品的部位清洗干净，以避免交叉干扰；三是取样前应将样品适当振摇均匀。

本文所建的定量模型，在选择建模谱段时参照

了文献^[2]报道的方法，结果证明该方法减少了计算量和缩短了运算时间，是一个值得学习推广的好方法。另外，模型测定结果与法定方法的结果相对偏差均在 $\pm 5\%$ 以内，适用于快速分析。作者曾将该模型在药品检测车上运用了一段时间，效果较好，达到了一定的初筛目的，较大地缩短了检测时间，提高了监控效能。

参考文献:

[1] 卫生部药品标准 [S]. 抗生素药品. 第一册, 1989: 60-60

[2] 邓茂刚, 刘晓强, 许琴瑟, 等. 紫外分光光度法测定氯霉素注射液的含量 [J]. 畜牧兽医学杂志, 2003, 22 (6): 11-13

[3] 赵银杰. 紫外分光光度法测定氯霉素注射液的含量 [J]. 中国兽药杂志, 2000, 34 (1): 22-23

[4] 朱传华, 艾春林. 用紫外法控制氯霉素注射液半成品含量 [J]. 黑龙江医药, 1995, 8 (4): 214-215

[5] 程红杰. HPLC 法测定氯霉素注射液的含量 [J]. 中国现代药物应用, 2009, 3 (18): 29-29

[6] 杨开金. HPLC 法测定氯霉素注射液的含量 [J]. 安徽医药, 2009, 13 (9): 1048-1050

[7] 金梅. 氯霉素片含量测定提取方法的改进 [J]. 安徽医药, 2004, 8 (3): 220-220

[8] 吴美芳. 高效液相色谱法测定氯霉素注射液中氯霉素的含量 [J]. 海峡药学, 2007, 19 (1): 93-93

[9] 曹宁芳, 刘鹏. 高效液相色谱法测定氯霉素注射液的含量 [J]. 西北药学杂志, 2007, 22 (4): 761-761

[10] 梅素容, 王鹏, 朱宽正, 等. 用液相色谱-串联质谱法测定蜂王浆中氯霉素残留量 [J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2006, 34 (2): 116-116

[11] 但菊开, 朱蕙, 张进东. 高效液相色谱法测定氯霉素注射液含量及其有关物质 [J]. 中国医院药学杂志, 2004, 24 (9): 585-586

[12] 魏京京, 吴建敏, 张启明. 近红外光谱法测定氯雷他定胶囊含量 [J]. 药物分析杂志, 2008, 28 (11): 1896-1899

(上接第 928 页)

[2] 饶跃峰, 谢先吉, 赵青威, 等. 复方止血栓中盐酸小檗碱的含量测定 [J]. 中国医院药学杂志, 2008, 28 (3): 245-247

[3] 陈镇, 谈超. 高效液相色谱法测定制痲酊中盐酸小檗碱的含量 [J]. 安徽医学, 2009, 30 (10): 1204-1205

[4] 孟蕾, 沈圣民, 张海鸣. 高效液相色谱法测定姜连止泻片中盐酸小檗碱的含量 [J]. 时珍国医国药, 2010, 21 (2): 303-304

[5] 徐世芳, 陈爱瑛, 姜丽霞. HPLC 法测定骨质宁搽剂中盐酸小檗碱的含量 [J]. 浙江中医药大学学报, 2007, 31(5): 618-619

[6] 霍金海, 张洪娟, 刘凯雷. HPLC 法测定丹槐银屑浓缩丸中盐酸小檗碱的含量 [J]. 中国中医药科技, 2010, 17 (6): 486-486

[7] 冯有龙, 曹玲, 王玉. HPLC 法测定中药中盐酸小檗碱时应注意的问题 [J]. 中国药品标准, 2007, 8 (6): 48-49

[8] 王克英, 方玲芬. 酒黄连中小檗碱 HPLC 含量测定 [J].

中国中药杂志, 2007, 32 (22): 2443-2444

[9] 张金安, 卢全德. HPLC 法测定清热解毒灌肠液中盐酸小檗碱的含量 [J]. 中国医院药学杂志, 2010, 30 (13): 1164-1165

[10] 程静, 何继祥, 梅群. HPLC 法测定结肠炎散中盐酸小檗碱含量 [J]. 中国药师, 2007, 10 (12): 1267-1268.

[11] 彭素莲. HPLC 法测定复方护肝颗粒中盐酸小檗碱的含量 [J]. 海峡药学, 2010, 22 (1): 61-62

[12] 周国莉, 林晓莲, 程聪. HPLC 法测定复方黄连液中盐酸小檗碱的含量 [J]. 中医药导报, 2010, 16 (8): 80-81

[13] 袁常青, 邢亮. 高效液相法测定黄连中盐酸小檗碱的含量 [J]. 亚太传统医药, 2010, 6 (8): 32-33

[14] 吕长淮. 盐酸小檗碱含量测定方法概述 [J]. 中国医药导报, 2010, 7 (33): 141-142

[15] 叶秀金, 宋粉云. HPLC 测定清肺抑火丸中盐酸小檗碱的含量 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17 (3): 90-92