碱对照品溶液 1.07 mg,按上述供试品溶液的制备方 法制备及色谱条件测定,计算回收率,结果见表 1。

表 1 回收率试验结果

试验号	样品取样量 /g	测得总量 /mg	加入对照品量 /mg	样品中含量 /mg	回收率 /%	平均回收率 /%	RSD /%
1	0.518 9	2.191 3	1.08	1.110 5	100.1		
2	0.502 3	2.140 5	1.07	1.075 0	99.6		
3	0.503 9	2.155 6	1.07	1.078 4	100.7	99.7	0.7
4	0.501 1	2.137 9	1.07	1.072 4	99.6		
5	0.501 8	2.127 6	1.07	1.073 9	98.5		
6	0.517 4	2.182 5	1.08	1.107 3	99.6		

2.9 样品测定

取 3 批样品,按上述方法制备供试品溶液和对照品溶液,按上述色谱条件操作,3 批样品测定结果见表 2。

表 3 样品含量测定结果

批号	平均含量/mg/片
050901	0.205 3
051002	0.224 5
051102	0.237 1

3 讨论

分别采用甲醇、乙醇溶剂,采用热回流和超声提取提取方法,以不同溶剂用量(20,50,100 mL)和

不同提取时间(20,30,45,60 min)对本品中盐酸麻黄碱的提取研究。结果表明:取本品 1 g,用甲醇 50 mL,加热回流提取 45 min,提取盐酸麻黄碱含量最高。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中国药典. 一部[S]. 北京:化学工业出版社,2005:265.
- [2] 何南生,曾宪仪,徐雪红,等. HPLC 法测定小儿咳喘灵口服液 中盐酸麻黄碱的含量[J]. 江西中医学院学报,2006,18(3): 45-46.
- [3] 王玉安,徐国庆,王卫峰,等. HPLC 测定咳喘宁颗粒中盐酸麻黄碱的含量[J]. 陕西中医,2005,27(10):1288-1289.

HPLC 法测定紫地宁血散中没食子酸的含量

张人福,许江红,张若良,赖佐发(赣州市食品药品检验所,赣州 341000)

摘要 目的:采用 HPLC 法测定紫地宁血散中没食子酸的含量。方法:色谱柱为 Diamonsil C₁₈(4.6 mm × 200 mm,5 μm),流动相为乙腈-含 0.1% 三乙胺的 0.1% 磷酸溶液(1:99),流速:1.0 mL · min⁻¹,检测波长为 273 nm。结果:线性范围为 0.051 ~ 0.612 μg, r = 1.000 0。平均回收率为 99.3%,RSD 为 1.2%。结论:本法简便、快速、准确,可用于产品的质量控制在。

关键词: 紫地宁血散;HPLC 法;没食子酸

中图分类号:921.2 文献标识码:A 文章编号:1009-3656(2009)-6-

Determination of Gallic Acid in Zidingingxue San by HPLC

Zhang Ren-fu, Xu Jiang-hong, Zhang Ruo-liang, Lai Zuo-fa (Ganzhou Institute for Food and Drug Control, Ganzhou 341000)

Abstract Objective: An HPLC method was established for the determination of Gallic Acid in Zidingingxue San. **Methods:** A Diamonsil C₁₈(4.6 mm × 200 mm,5 μm) column was used with Acetonitrile and 0.1% phosphoric acid containing 0.1% triethylamine(1:99) as the mobile phase, with flow rate 1.0 mL · min⁻¹ and the detection wavelength 273 nm. **Results:** The linear range was 0.051 μg ~ 0.612 μg, r = 1.000 0. The average recovery was 99.3% and the RSD was 1.2%. **Conclusion:** The method was convenient, sensitive and accurate. So it could be used for quality control.

作者简介:张人福,男,副主任中药师。学科及研究方向:药物分析。联系电话:0797-8370887。

Key words: Zidiningxue San; HPLC; Gallic Acid

紫地宁血散由大叶紫珠、地苿等药味组成的复方制剂,具有清热凉血的功效,用于治疗胃及十二指肠溃疡或胃炎引起的吐血,便血,属胃中积热型者。该制剂收载于《卫生部药品标准》新药转正第九册中,标准中无含量测定方法,不利于质量控制,本文采用 HPLC 法对制剂中地苿的有效成分没食子酸^[1-2]进行含量测定,所建立的方法准确可靠、专属性强、简便快捷,可用于该制剂的质量控制。

1 仪器与试剂

Waters 高效液相色谱仪(515 泵,2487 紫外检测器,Millennium32 色谱工作站),BP211D 型电子天平;没食子酸对照品(中国药品生物制品检定所,批号 00831-9501);紫地宁血散(同一厂家,市售品,批号 060801,060802,060803);乙腈为色谱纯,水为重蒸馏水,其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

色谱柱: DiamonsilC₁₈ (4.6 mm × 200 mm, 5 μm),流动相:乙腈-含 0.1% 三乙胺的 0.1% 磷酸溶液(1:99),流速:1.0 mL · min⁻¹;检测波长:273 nm,柱温:室温,进样量:10 μL。理论板数:按没食

子酸峰计算应不低于 4 000,没食子酸峰与相邻杂峰的分度应大于 2.0。

2.2 溶液制备

2.2.1 对照品溶液制备 精密称取没食子酸对照品 10.20 mg,置 100 mL 量瓶中,加 50% 甲醇溶解并稀释至刻度,作为对照品储备液。精密量取储备液 10 mL 置 50 mL 量瓶中,加 50% 甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。

2.2.2 供试品溶液制备 取装量差异项下供试品,混匀,精密称取约 1.5 g,置具塞锥形瓶中,精密加入 50% 甲醇 50 mL,称定重量,置水浴上回流 30 min,取出,放冷,再称定重量,用 50% 甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

2.2.3 阴性溶液制备 取不含地苿的阴性制剂按供试品溶液的制备方法制成阴性溶液。

2.3 干扰试验

取供试品溶液,对照品溶液和阴性溶液各 10 μL,在上述色谱条件下进样,分析,供试品溶液主峰的保留时间与对照品主峰的保留时间一致,且阴性无干扰,见图 1。

图 1 紫地宁血散的 HPLC 色谱图

A. 对照品; B. 样品; C. 阴性样品; 1. 没食子酸

2.4 线性关系考察

精密量取对照品储备液 0.5, 1, 2, 4, 6 mL 分别置 10 mL 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,各进样 10 μL,测定。以进样中没食子酸量为横坐标,峰面积为纵坐标绘制标准曲线,计算回归方程为: $Y = 3.7972 \times 10^6 X - 1.8134 \times 10^4$, $r = 1.0000$,结果表明:没食子酸在 0.051 ~ 0.612 μg 内呈良好的线性关系。

2.5 精密度试验

取对照品溶液重复进样 5 次,测得峰面积的 RSD 为 0.34%。

2.6 稳定性试验

取同一供试品溶液(批号:060801)于配制后 0, 2, 4, 6, 8 h 分别进样 10 μL,测得峰面积的 RSD 为 1.1%,表明供试品溶液在 8 h 内稳定。

2.7 重复性试验

取本品(批号 060801),照供试品溶液制备方法制成供试品溶液($n = 6$),分别测定含量,平均含量为 $0.759 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$,RSD 为 0.34%。

2.8 回收率试验

取已知含量的供试品约 0.75 g,精密称定,分别精密加入对照品溶液($0.0104 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$)50 mL,按供试品溶液制备方法处理,测定含量,计算回收率,结果见表 1。

表 1 回收率测定结果 ($n=6$)

取样量 /g	样品中含量 /mg	加入对照品量 /mg	测得量 /mg	回收率 /%	平均回收率 /%	RSD /%
0.751 5	0.570	0.520	1.086	99.2	99.3	1.2
0.757 0	0.575	0.520	1.096	100.2		
0.753 2	0.57 2	0.520	1.093	100.2		
0.756 8	0.57 4	0.520	1.092	99.6		
0.751 1	0.57 0	0.520	1.074	96.9		
0.752 4	0.57 1	0.520	1.089	99.6		

2.9 样品测定

取 3 批样品,依法制备供试品溶液,分别取对照品溶液,供试品溶液 10 μL 进样,测定峰面积,按外标法计算含量,结果见表 2。

表 2 样品测定结果

批号	含量/ $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$
060801	0.759
060802	0.800
060803	0.696

3 讨论

3.1 试用乙腈 $-0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 磷酸(1:99)^[3] 为流动相,结果分离效果不好,且柱效不高,本文流动相中加入三乙胺,具有更好的分离度与柱效。

3.2 提取条件 在前期试验过程中,试用甲醇^[4] 为提取溶剂,结果主峰存在干扰峰,且基线不易走平,改用 50% 甲醇提取,色谱图得到明显改善,试验同一批样品经 30, 60, 90 min 回流后分别测定含量,结果显示回流 30 min 即可提取完全。

3.3 据文献,地苾中没食子酸多以苷的形式存在,需加酸水解方能游离出没食子酸,试验比较: 50%

甲醇^[5]、50% 甲醇(含 4% 盐酸)^[6] 为溶剂相同条件提取样品并测定含量,结果两法所得样品中没食子酸的含量相同,但加酸水解提取所得色谱图基线漂移,所以,本文不采用加酸水解提取。

3.4 经试验,用本文方法色谱条件,在下列色谱柱试验: Phenomenex $\text{C}_{18(2)}$ (4.6 mm $\times$ 250 mm, 5 μm), Kromasil 100A C_{18} (4.6 mm $\times$ 200 mm, 5 μm), 结果得到良好的色谱图及重现性,且所得含量一致。

参考文献

- [1] 张超,方岩雄. 中药地苾的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2003, 28. (05): 429-431.
- [2] 廖宝珍,阙惠卿等,林绶. 地苾的研究进展[J]. 海峡药学, 2007, 19(12): 3-7.
- [3] 何迅,李勇军,刘丽娜. RP-HPLC 测定地苾药材中没食子酸的含量[J]. 中国中药杂志, 2005, 30(3): 180-181.
- [4] 韩林涛,黄芳. 高效液相色谱法测定克淋通分散片中没食子酸含量的方法学研究[J]. 湖北中医学院学报, 2008, 10(2): 46-48.
- [5] 李小安,史美佳. HPLC 法测定速效止泻胶囊中没食子酸的含量[J]. 陕西中医学院学报, 2007, 30(2): 58-59.
- [6] 李才堂,宋友昕,李晶. 高效液相色谱法测定地苾药材中没食子酸含量[J]. 江西中医学院学报, 2005, 17(4): 37.

HPLC 法测定香附丸(水丸)中芍药苷的含量

王二云,杨焯伟,郝美玲(内蒙古食品药品检验所,呼和浩特 010020)

摘要 目的:建立 HPLC 法对香附丸(水丸)中芍药苷的含量测定方法。方法:采用 HPLC 法。色谱柱:Alltech Apollo C_{18} 色谱柱(4.6 mm $\times$ 250 mm, 5 μm), 流动相:A 为乙腈, B 为 0.1% 磷酸溶液, 梯度洗脱程序为 0 min(14% A), 21 min(86% A), 41 min(14% A); 检测波长:230 nm; 流速为 1.0 mL $\cdot$ min⁻¹; 柱温为 30 $^{\circ}\text{C}$ 。结果:芍药苷在 0.123 6 ~ 1.854 μg 内呈良好的线性关系, 回归方程为 $Y = 1.06 \times 10^6 X - 2.33 \times 10^3$, $r = 1.000 0$; 平均回收率为 99.07% (RSD = 0.35%)。结论:本法准确度高,重复性好,可作为本制剂的质量控制方法。

关键词: 香附丸(水丸); 芍药苷; HPLC 法; 含量测定

中图分类号: 921.2 文献标识码: A 文章编号: 1009-3656(2009)-6-448-3

作者简介: 王二云,女,主管中药师。学科及研究方向:中成药检验。联系电话:13948711332。

HPLC法测定紫地宁血散中没食子酸的含量

作者: [张人福](#), [许江红](#), [张若良](#), [赖佐发](#), [Zhang Ren-fu](#), [Xu Jiang-hong](#), [Zhang Ruo-liang](#), [Lai Zuo-fa](#)
作者单位: [赣州市食品药品监督管理局, 赣州, 341000](#)
刊名: [中国药品标准](#)
英文刊名: [DRUG STANDARDS OF CHINA](#)
年, 卷(期): [2009, 10\(6\)](#)

参考文献(6条)

1. [李才堂;宋友昕;李晶](#) 高效液相色谱法测定地稔药材中没食子酸含量[期刊论文]-[江西中医学院学报](#) 2005(04)
2. [李小安;史美佳](#) HPLC法测定速效止泻胶囊中没食子酸的含量[期刊论文]-[陕西中医学院学报](#) 2007(02)
3. [韩林涛;黄芳](#) 高效液相色谱法测定克淋通分散片中没食子酸含量的办法学研究[期刊论文]-[湖北中医学院学报](#) 2008(02)
4. [何迅;李勇军;刘丽娜](#) RP-HPLC测定地稔药材中没食子酸的含量[期刊论文]-[中国中药杂志](#) 2005(03)
5. [廖宝珍;阙惠卿;林绥](#) 地稔的研究进展[期刊论文]-[海峡药学](#) 2007(12)
6. [张超;方岩雄](#) 中药地稔的化学成分研究[期刊论文]-[中国中药杂志](#) 2003(05)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgypbz200906018.aspx